Cérambycides récoltés en Afrique tropicale

Par P. Lepesme et St. Breuning.

Le Laboratoire d'Entomologie Agricole Coloniale ayant enrichi ses collections d'une série de Longicornes dont les larves de la plupart d'entre eux vivent aux dépens de végétaux cultivés, a bien voulu nous en communiquer une première série. Nous donnons ci-dessous le résultat de leur étude en faisant remarquer que la plus grande partie des espèces ont été récoltées par Mr. Pujol au cours de ses séjours en Guinée.

Subfam. CERAMBYCINAE (*sensu* Lep. et Br.).

Supertribu *CERAMBYCINA* Lep. et Br.

Œmini.

Xystrocera dispar Fahr. : Guinée française, Kissidougou (R. Pujol, 1950, n° 769 [1]).

Xystrocera femorata Chevr. : Guinée, Macenta (R. Pujol, 1953, n° 759 et n° 768).

Xystrocera sp. : Guinée, Macenta (R. Pujol, 1953, n° 749).

Cerambycini.

Plocaederus denticornis F. : Guinée, Kissidougou (R. Pujol, 1950, n° 773).

Cette espèce qui se rencontre en Afrique intertropicale, du Sénégal au Mozambique, a été observée comme nuisible au caféier (*Coffea robusta* et *Coffea canephora*) en Région forestière de Guinée.

Plocaederus Vayssierei, n. sp.

Proche de *basalis* Gah. et de *chloropterus* Chevr., mais se séparant du premier par les rides du pronotum régulièrement transversales et du second, qui possède des rides semblables, par sa ponctuation extrêmement dense comme chez *basalis* Gah.

Type de Guinée Française, Macenta (R. Pujol, 1953, n° 767) ; au Muséum de Paris.

Derolus arciferus Cah. : Guinée, Kissidougou (R. Pujol, 1950, n° 761).

HESPEROPHANINI.

Hesperophanes fasciatus Billb : Guinée, Kissidougou (R. PUJOL, 1950, nº 760).

Cerasphorus hirticornis Serv. : Guinée, Kissidougou (R. PUJOL, 1950, nº 771).

CALLICHROMINI.

Conamblys latus Qued. v. **rubrofemoralis** *nova.*

Comme la forme typique, mais la massue des fémurs antérieurs et médian brun rouge.

Type du Moyen-Congo (Mocquerys), dans la collection LEPESME ; un cotype de Guinée française, Kissidougou (R. PUJOL, 1950, nº 770).

Supertribu *AUXESINA* Lep. et Br.

Parauxesis cicatricosa Auriv. : Guinée française, Macenta (R. PUJOL, 1953, nº 758).

Subfam. LAMIINAE

PROSOPOCERINI.

Prosopocera (s. s.) *antennata* Gah. : Guinée française, Macenta (R. PUJOL, 1953, nº 765).

Prosopocera (s. s.) *lactator* F. : Guinée française, Kissidougou, (R. PUJOL, 1950, nº 764).

Prosopocera (Alphitopola) Pujoli *n. sp.*

Type du Moyen Congo (Mocquerys), dans la collection LEPESME ; un cotype de Guinée française, Kissidougou (R. PUJOL, 1950, nº 770).

Proche de *Gahani* Auriv., mais plus petit, les lobes inférieurs des yeux cinq fois plus longs que les joues, le pronotum sans épine latérale, les bandes blanches prothoraciques non interrompues par des tâches, la deuxième tâche blanche des élytres plus grande et surtout plus longue, non dentelée sur ses bords et non interrompue par une tâche brun rougeâtre.

Long. : 10 mm., large 3 mm.

Type de Guinée française, N'Zappa (R. PUJOL, 25-v-1953, nº 752). au Muséum de Paris.

STERNOTOMINI.

Zographus regalis Brown. : Guinée, Macenta, IX-1953 (R. PUJOL, nº 766).

Tragocephalini.

Charieslhes bella Dalm. : Guinée française, N'Zappa (R. Pujol, 25-v-1953). Commun sur Caféier.

Murosternum pulchellum Dalm. : Moyen-Congo, Etoumbi, V-vi-1947 (Lestanc, n° 745). Sur Palmier.

Armatosterna buquetiana White. : Guinée française, Macenta, (R. Pujol, 1953, n° 750).) Espèce peu commune sur Caféier en Région forestièrc de Guinée.

Phosphorus virescens Ol. v. *Jansoni* Chevr. Guinée française, Macenta. (R. Pujol, xii-1953, n° 772).

Larves nuisibles au Kolatier (*Cola acuminata* et *nitida*.)Elles minent les rameaux du Kolatier ; les galeries sont le plus souvent ascendantes ; ces galeries affaiblissent le Kolatier attaqué ; le plus souvent les branches se déssèchent et meurent. (D'après les observations de R. Pujol en Région forestière de Guinée).

Crossotini.

Dichostathes lobatus Jord. : Moyen-Congo, Etoumbi, V-vi-1947 (Lestanc, n° 747). Sur Palmier.

Phrynetini.

Phrynetopsis fuscicornis Chevr. : Guinée française, Macenta (R. Pujol, 12-x-1953, n° 762).

Phryneta hecphora Thoms. : Guinée française, Macenta (R. Pujol, 1953, n° 763).

Apomecynini.

Apomecyna parumpunctata Chevr. : Moyen-Congo, Etoumbi, V-vi-1947 (Lestanc, n^{os} 744-748). Sur Palmier.

Enaretta Castelnaudi Thoms. : Côte d'Ivoire, Bouaké (P. Malzy, ii-1956, n° 729).

Ropica congoana Br. : Camcroun, Baigom, région Bamoun (J. Carayon, 1947, n° 774).

Hippopsini.

Hippopsicon puncticolle Auriv. : Guinée française (R. Pujol, 1953, n° 755).

Saperdini.

Glenea (s. s.) *giraffa* Dalm. Guinée française, Macenta (R. Pujol, n° 754). Sur Cacaoyer (Macenta).

Glenea (s. s.) *leucospila* Kord. : Guinée française, Macenta (R. Pujol, 1953, nº 751).

Glenea (*Volumnia*) *apicalis* Chevr. : Guinée française, Macenta (R. Pujol, II-1953, nº 756). Cameroun (P. Malzy, 1950, nº 775).

Obereopsis obscuritarsis Chevr. : Guinée française (R. Pujol, 1953, nº 757).

Astathini.

Hecphora testator F. : Moyen-Congo, Etoumbi, V-VI-1947 (Lestanc, nº 746). Sur Palmier.